

MACEIODONTO 2015 – PAINEL APROVADO

NUMERO DO PAINEL: 281

POSIÇÃO: 44

AUTOR PRINCIPAL:

RAFAELLA AMORIM BITTENCOURT MARANHÃO DE ARAÚJO

TITULAÇÃO DO AUTOR PRINCIPAL:

GRADUANDA

CO-AUTORES: (no máximo 4)

VALTUIR BARBOSA FELIX;

KATHARINA JUCÁ DE MORAES FERNANDES;

JOSÉ ANDRÉ BERNARDINO DOS SANTOS;

TITULAÇÃO DOS CO-AUTORES:

DOUTOR VALTUIR BARBOSA FELIX;

MESTRE KATHARINA JUCÁ DE MORAES FERNANDES;

MESTRE JOSÉ ANDRÉ BERNARDINO DOS SANTOS;

TÍTULO DO TRABALHO: (máximo 140 caracteres, sem contar os espaços)

RETENÇÃO DE CANINO NA SÍNFISE MANDIBULAR: RELATO DE CASO

EIXO/ESPECIALIDADE:

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL

**RESUMO:** (entre 1200 e 1800 caracteres, contando com os espaços)

Os caninos inferiores são dentes com importância estética e funcional. A sua retenção está normalmente associada a fatores etiológicos como trauma no germe decíduo e ausência de espaço. Dados epidemiológicos demonstram que são raros os casos de retenção de caninos mandibulares, em relação aos caninos maxilares, apresentando uma razão de 1:20, além disso, é mais comum em mulheres. Este estudo teve como objetivo, realizar uma revisão de literatura e relatar a remoção de um canino incluso na região de sínfise mandibular. Paciente F.S., 24 anos, gênero masculino, feoderma, compareceu ao consultório odontológico referindo presença de dente incluso em sínfise mandibular descoberto em exame de rotina para tratamento ortodôntico. Ao exame extra-oral, apresentava face simétrica, e no exame intra-oral foi possível observar a ausência do dente 33 e manutenção do dente 73. A radiografia panorâmica e telerradiografia lateral revelaram a presença do dente 33 posicionado horizontalmente no lado direito do corpo mandibular e próximo a cortical vestibular. O paciente foi submetido à remoção do dente, sob anestesia local. Atualmente o paciente encontra-se em acompanhamento clínico sem queixa de dor e ausência de edema. Após estudo do caso, foi possível concluir que a retenção de caninos inferiores é uma anomalia rara e que os exames de rotina possuem fundamental importância para estes casos, uma vez que esta condição pode propiciar o desenvolvimento de lesões orais.

**PALAVRAS-CHAVE:**

Canino; Dente incluso; Mandíbula; Retenção.

Autorizo, a ABO-AL a publicar e/ou divulgar fotos do trabalho em qualquer meio ou via de divulgação, nacional e internacional, não cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso da imagem; e a publicação deste trabalho nos anais do Congresso Alagoano de Odontologia – Maceiodonto 2015.

