

MACEIODONTO 2015 – PAINEL APROVADO

NUMERO DO PAINEL: 459_____

POSIÇÃO: 39_____

AUTOR PRINCIPAL:

Shayenne Calheiros Manfredo de Azevedo

TITULAÇÃO DO AUTOR PRINCIPAL:

Graduanda em odontologia

CO-AUTORES: (no máximo 4)

Laís Melyna da Silva Mendonça

Catarina Rodrigues Rosa de Oliveira

Camila Maria Beder Ribeiro

TITULAÇÃO DOS CO-AUTORES:

Graduanda em odontologia

Mestranda em radiologia e imaginologia

Doutora em estomatologia

TÍTULO DO TRABALHO: (máximo 140 caracteres, sem contar os espaços)

Lipoma Fibrosado: Relato de Caso

EIXO/ESPECIALIDADE:

Estomatologia

RESUMO: (entre 1200 e 1800 caracteres, contando com os espaços)

Os lipomas são neoplasias mesenquimais adiposas, que na maioria dos casos acomete o tronco e a porção proximal das extremidades. Ocasionalmente formam-se dentro da cavidade bucal. A patogênese é incerta, sendo mais comum em pacientes obesos. Os lipomas da cavidade oral não tem predileção por sexo e acomete normalmente pacientes acima de 40 anos. São de crescimento lento, bem delimitado, indolor, podendo ser superficial ou profundo. O presente relato, teve como objetivo comunicar o caso da paciente V.C.V.S, 36 anos, gênero feminino leucoderma, que compareceu ao serviço de estomatologia do PAM salgadinho, queixando-se de uma "bolinha na bochecha", que já existia há aproximadamente 1 ano e 6 meses. Na história da doença a lesão era indolor mas com crescimento desde o seu surgimento, causando incômodo ao comer e falar. Não foram observadas alterações no exame extra oral, no entanto, no exame bucal foi observada presença de lesão nodular, localizada em mucosa jugal, normocrômica, mole à palpação, indolor, de superfície normal e medindo aproximadamente 11x 9x 0.5 mm. A paciente foi submetida a biópsia excisional, sob anestesia local. A peça cirúrgica foi encaminhada para estudo anatomopatológico com hipótese de diagnóstico de lipoma. Os cortes histológicos revelaram fragmento de mucosa revestido por epitélio pavimentoso queratinizado com lâmina própria intensamente fibrosada e exibindo uma área de adipócitos em seu interior, compatível com lipoma fibrosado. Os lipomas, apesar de serem neoplasias benignas e possuírem baixa recidiva necessitam de um diagnóstico correto para que sejam tratados de forma adequada.

PALAVRAS-CHAVE:

Lipoma fibrosado, Neoplasias bucais, Mucosa jugal.

Autorizo, a ABO-AL a publicar e/ou divulgar fotos do trabalho em qualquer meio ou via de divulgação, nacional e internacional, não cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso da imagem; e a publicação deste trabalho nos anais do Congresso Alagoano de Odontologia – Maceiodonto 2015.