

MACEIODONTO 2015 –PAINEL APROVADO

NUMERO DO PAINEL: \_466\_

POSIÇÃO: \_\_\_46\_\_\_

AUTOR PRINCIPAL:

Francielle Santos Nascimento

TITULAÇÃO DO AUTOR PRINCIPAL:

Acadêmico de Odontologia

CO-AUTORES: (no máximo 4)

Rafaelle Cavalcanti, Ana Luiza Pontes de Oliveira, Camila Maria Beder Ribeiro, Aurea Valéria de Melo Franco.

TITULAÇÃO DOS CO-AUTORES:

Rafaelle Cavalcanti (acadêmica de odontologia); Ana Luiza Pontes de Oliveira (acadêmica de odontologia); Camila Maria Beder Ribeiro (mestrado em Odontologia – área de concentração em Clínica Integrada – Doutora em Estomatopatologia); Aurea Valéria de Melo Franco (especialista em Radiologia Odontológica; Mestra em Odontologia na área de Radiologia Odontológica e Imaginologia.

TÍTULO DO TRABALHO: (máximo 140 caracteres, sem contar os espaços)

CORTICOTERAPIA TÓPICA E SISTEMICA NO CONTROLE DA GENGIVITE DESCAMATIVA ASSOCIADA AO LIQUEN PLANO ORAL

EIXO/ESPECIALIDADE:

Estomatologia

## RESUMO: (entre 1200 e 1800 caracteres, contando com os espaços)

O líquen plano é uma doença crônica autoimune mediada por linfócitos T que afeta o epitélio escamoso estratificado. O líquen plano oral (LPO) afeta mulheres de meia idade e apresenta características como estriações brancas, pápulas ou placas brancas, eritema, erosões e bolhas, que podem estar associadas a medicações e/ou materiais dentários no paciente. O diagnóstico de LPO deve ser feito por meio de exame clínico e histológico. As características histopatológicas podem apresentar degeneração liquefativa da camada basal, infiltrado inflamatório denso de linfócitos T em forma de banda, maturação normal do epitélio, proeminências anatômicas com aparência de dentes de serra, corpos de Civatte e hiperqueratose. O tratamento das lesões sintomáticas é feito com terapia anti-inflamatória, principalmente corticosteroides tópicos. Diante do presente, relata-se um caso de uma paciente, gênero feminino, 44 anos. No exame clínico foi observado gengivite descamativa difusa, com queixa principal de gengivite e ardência ao realizar higiene oral. Foi então realizado uma biópsia, apresentando através dos cortes histológicos fragmento de mucosa revestido por epitélio pavimento estratificado com paraceratose. No córion observava-se intenso infiltrado inflamatório mononuclear em faixa. Concluindo-se então, juntamente as características clínicas e histopatológicas, o diagnóstico de líquen plano. O tratamento foi realizado com uso de corticosteroides e a sintomatologia foi controlada. O caso ressalta o controle da doença por meio do uso da corticoterapia tópica e sistêmica.

## PALAVRAS-CHAVE:

Líquen; Paraceratose; Gengivite.

Autorizo, a ABO-AL a publicar e/ou divulgar fotos do trabalho em qualquer meio ou via de divulgação, nacional e internacional, não cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso da imagem; e a publicação deste trabalho nos anais do Congresso Alagoano de Odontologia – Maceió 2015.