

MACEIODONTO 2015 – PAINEL APROVADO

NÚMERO DO PAINEL: 467

POSIÇÃO: 47

AUTOR PRINCIPAL:

PORDEUS SDS (Sáskia de Souza Pordeus).

TITULAÇÃO DO AUTOR PRINCIPAL:

Aluna do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC.

CO-AUTORES: (no máximo 4)

FERREIRA SMS (Sonia Maria Soares Ferreira), SANTOS CC (Camille Cavalcante dos Santos),  
CORREIA MCM (Mylene Claudia Moraes Correia), MENEZES PAF (Pedro Affonso Ferreira de  
Menezes).

TITULAÇÃO DOS CO-AUTORES:

Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC, aluna do curso de Odontologia  
do Centro Universitário CESMAC, aluna do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC,  
aluno do curso de Odontologia do Centro Universitário CESMAC.

TÍTULO DO TRABALHO: (máximo 140 caracteres, sem contar os espaços)

MUCOCELE EM LÁBIO INFERIOR: Relato de caso clínico.

EIXO/ESPECIALIDADE:

ESTOMATOLOGIA.

RESUMO: (entre 1200 e 1800 caracteres, contando com os espaços)

Mucoceles são as lesões mais comuns de glândulas salivares menores. Correspondem, histologicamente, à fenômenos de extravasamentos ou de retenção de muco e estão, com frequência, associadas à situações de traumatismos, hábitos parafuncionais e à obstrução dos ductos excretores. Sua localização mais frequente é no lábio inferior, e embora seja assintomática na grande maioria dos casos, seu crescimento exofítico pode acarretar em desconforto durante a alimentação e a fala, além de comprometimento estético e desenvolvimento de hábitos deletérios. Paciente J.R.D.S., 28 anos, leucoderma, portador de Paralisia Cerebral, compareceu à Clínica de Odontologia do CESMAC queixando-se de um “caroço no lábio”. Ao exame clínico, verificou-se nódulo de coloração normocrômica em mucosa de lábio inferior direito e móvel à palpação. Realizou-se biópsia excisional no local. Ao exame histopatológico, confirmou-se a hipótese clínica de mucocele, observou-se cavidade circunscrita envolta por tecido de granulação com mucina livre, infiltrado de leucócitos polimorfonucleares, linfócitos e plasmócitos. O tratamento consistiu em biópsia excisional. A mucocele é uma lesão benigna da cavidade bucal relativamente comum. Causada pelo extravasamento salivar no tecido conjuntivo consequente do rompimento do ducto de uma glândula salivar. Normalmente é tratada por biópsia excisional pela técnica de enucleação cirúrgica.

#### PALAVRAS-CHAVE:

Mucocele. Lábio Inferior. Biópsia Excisional.

Autorizo, a ABO-AL a publicar e/ou divulgar fotos do trabalho em qualquer meio ou via de divulgação, nacional e internacional, não cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso da imagem; e a publicação deste trabalho nos anais do Congresso Alagoano de Odontologia – Maceiodonto 2015.