

MACEIODONTO 2015 – PAINEL APROVADO

NUMERO DO PAINEL: 340

POSIÇÃO: 40

AUTOR PRINCIPAL:

Jéssica Augusta Paula dos Santos¹

TITULAÇÃO DO AUTOR PRINCIPAL:

Acadêmica de Odontologia¹

CO-AUTORES: (no máximo 4)

Diogo Dionízio Delmiro dos Santos²
Evalanne Pessoa Tenorio³
Sonia Maria Soares Ferreira⁴
Camila Maria Beder Ribeiro⁵

TITULAÇÃO DOS CO-AUTORES:

Acadêmico de Odontologia²
Acadêmica de Odontologia³
Especialista em Estomatologia e Residência Médica, Mestrado em CTBMF e Doutorado em Clínica Médica⁴
Especialização em Gestão em Saúde, Mestrado em Odontologia, Doutorado e PhD em Estomatopatologia⁵

TÍTULO DO TRABALHO: (máximo 140 caracteres, sem contar os espaços)

LÍQUEN PLANO COM MANIFESTAÇÃO EM BOCA E PELE: RELATO DE CASO

EIXO/ESPECIALIDADE:

Estomatologia

RESUMO: (entre 1200 e 1800 caracteres, contando com os espaços)

Líquen plano (LP) é uma alteração mucocutânea considerada uma desordem imunológica e caracterizada por linhas brancas ceratóticas entrelaçadas (estrias de Wickham) localizadas de forma simétrica nas mucosas. O caso relata um paciente gênero masculino, 59 anos, feoderma, que procurou a área de estomatologia no posto de saúde em Maceió relatando que foi percebida a presença de uma lesão no palato há 1 mês pelo seu dentista. Na história médica, o paciente relatou a presença de lesões em pele há 15 anos atrás. Durante o exame intrabucal notou-se a presença de uma lesão em placa estriada no palato, coloração eritroleucoplásica, assintomática, tamanho 3x2x0,1 cm. A conduta exercida foi a realização de biópsia incisional. O exame histopatológico apresentou fragmentos de mucosa revestidos por epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, áreas de acantose, hiperqueratose, atrofia e exostose; tecido conjuntivo com infiltrado inflamatório linfoplasmocitário, degeneração hidrópica da camada basal e corpos de civatte. O diagnóstico foi de LP Oral (LPO). A conduta exercida foi a realização de consultas periódicas, e 4 meses depois o paciente apresentou novas lesões em mucosa jugal do lado esquerdo; mais 4 meses depois ele apresentou lesões em pele e foi encaminhado pra dermatologista que prescreveu Valerato de Betametasona (creme); após mais 6 meses ele retornou com lesões no palato estáveis, mas apresentou novas lesões em dorso e borda bilateral de língua e foi prescrito Clobetasol gel odontológico (0,05%) e marcado reavaliação para 6 meses. O LPO apresenta risco de transformação maligna, principalmente se o paciente for exposto a fatores de risco, o que ressalta a importância do dentista no correto diagnóstico, orientações, tratamento e acompanhamento do caso.

PALAVRAS-CHAVE:

Autorizo, a ABO-AL a publicar e/ou divulgar fotos do trabalho em

Líquen plano; mucocutânea; estrias.

qualquer meio ou via de divulgação, nacional e internacional, não cabendo qualquer direito autoral ou sobre o uso da imagem; e a publicação deste trabalho nos anais do Congresso Alagoano de Odontologia – Maceiodonto 2015.